

## 口腔手術局部麻醉說明書

因為人工牙根植入單純齒切除複雜齒切除（手術），您必需同時接受麻醉，除輔助手術順利施行外，可以使您免除手術時的痛苦和恐懼，並維護您生理功能之穩定，但對於部分接受麻醉之病人而言，有可能發生以下之副作用及併發症：

- 1. 部分患者可能對麻醉藥如Lidocaine, Xylocaine, Articaine ……等有過敏反應。
- 2. 局部麻醉之副作用，可能造成頭痛、頭暈、心跳加速、噁心、嘔吐、感覺異常等……症狀，較嚴重的副作用症狀，如嗜睡、意識混亂、震顫、肌肉抽搐、肌肉痙攣、昏迷及呼吸麻痺……等等，而嚴重的心血管疾病患者所產生的副作用症狀，則是以血壓突降、心跳失律過慢及心血管衰竭等形式出現，所以如果患有全身性系統性疾病，心臟方面的疾病或是對於麻醉藥，抗生素等藥物過敏，請事先告訴醫師。
- 3. 局部麻醉之禁忌症如下，若你有以下症狀則不建議施打麻藥並請告知醫師，以免發生危險：

嚴重低血壓 嚴重高血壓急性心衰竭急性充血性青光眼糖尿病代謝情況失常嗜鉻細胞瘤甲狀腺毒症心臟有嚴重的神經脈動及傳導系統的障礙心絞痛血管硬化血液凝固障礙

醫療機構\_\_\_\_\_醫師\_\_\_\_\_

病患簽名欄\_\_\_\_\_日期\_\_\_\_\_