

2019 年全國潔牙觀摩賽試題

學生編號：_____


每格 5 分，滿分 100 分

- (X)1.在飲水家氟的地區，我們會建議配合使用氟錠，可以達到雙效保護牙齒。
- (O)2.牙周韌帶是位於牙根與齒槽之間的部分，可以提供咬合力的緩衝及齒槽骨的營養。
- (O)3.幼兒飲食習慣中，該注意吃飯過慢或含飯習慣，會造成早發性幼兒齲齒。
- (X)4.牙齦紅腫發炎及流血，代表極有可能是患有牙周病。
- (O)5.口水多的人，比較不容易蛀牙。
- (O)6.長期鼻過敏患者，容易造成咬合不正。
- (X)7.如果因跌倒造成乳門齒脫落，應盡快撿起並保存在生理食鹽水中，到牙科診所請醫師處理後，再植入齒槽。
- (O)8.如果因跌倒造成乳門輕微撞入齒槽骨，不需要治療。
- (O)9.乳牙齲蛀到神經不治療，會造成未來要長出的恆牙牙齒表面變色或變形。
- (O)10.媽媽用自己的使用的筷子，夾取食物給小朋友吃，可能會造成齲齒菌的傳染。

11.右圖，箭頭指的組織是什麼？牙骨質

12.大約到12歲會長出 28 顆恆齒

13.在 0-3 歲齲齒風險評估中，高風險的患者，每三個月塗氟一次。



14 過於頻繁的吸允奶嘴，易造成何種咬合不正？前牙開咬。
建議三歲前戒除吸奶嘴的習慣，其咬合不正較易回復正常。

15 每週使用一次的含氟漱口水，其含氟量為900 PPM。

16.三到六歲的小朋友，每天使用的氟錠為0.5 mg。

17.如果一個無法配合牙科治療的兒童，又不適合傳統的行為管理，可以使用的藥物輔助治療的方式，有三種：1.笑氣鎮靜 2.藥物鎮靜 3.全身麻醉。

18.氟錠使用，建議可以使用到幾歲？16 歲。